

**BAREM NOTARE pentru concursul de ocupare a postului de infirmier debutant  
desfasurat in data de 07.07.2025**

**varianta 2**

**SUBIECTUL I**

1. Scopul procedurii privind curatenia saloanelor este:
  - a. de a stabili modul de realizare a gestionarii deseuriilor;
  - b. prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale/focarelor;**
  - c. aparitia cazurilor de boli profesionale la personal;
  - d. asigurarea asistentei medicale in conditii de maxima siguranta.
2. Spatiul central de depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - a. sa asigure mentinerea calitatii initiale a produselor pe durata depozitarii;**
  - b. sa detina sursa de apa rece si calda.
  - c. pavimentul si peretii sa fie impermeabili si usor de curatat;**
  - d. zona de depozitare sa permita aranjarea in ordine a materialelor de curatare si accesul usor la acestea;**
3. În funcție de eficacitate, de timpul de contact și de concentrația utilizată, nivelurile de dezinfecție sunt:
  - a. dezinfecție de nivel înalt;**
  - b. dezinfecție de nivel superior;
  - c. dezinfecție de nivel mediu;
  - d. dezinfecție de nivel scăzut.**
4. Pozitia pentru alimentarea activa este:
  - a.semisezanda laterală
  - b.sezanda**
  - c.decubit dorsal
  - d.decubit lateral**

5. Sunt transportati cu targa in decubit dorsal,pacientii:

- a.**pacienti cu traumatisme abdominale**
- b.pacienti cu traumatisme toraco-abdominale
- c.pacienti in colaps periferic
- d.**accidentati in stare de soc cu hemoragie**

6. Care este principalul scop al epidemiologiei?

- a.intelegerea mecanismului de transmitere a infectiei
- b.prevenirea si combaterea imbolnavirilor**
- c.identificarea factorilor de agresiune pentru sanatate
- d.intelegerea mecanismului de transmitere a infectiei ,identificarea factorilor de agresiune.

7. Pricipalele categorii de drepturi ale pacientilor sunt:

- a.dreptul la ingrijire medicala,dreptul decurgand din dreptul fundamental la respectul vietii private,dreptul la securitate economica si sociala
- b.dreptul la ingrijire medicala,dreptul la informare si carecturul obligatoriu al consimtamantul pacientului ,dreptul decurgand din dreptul fundamental la viata, dreptul sa refuze o interventie**
- c.dreptul la informare,dreptul la o alta opinie medicala, dreptul la invatatura,drreptul de a beneficia de cultura.

8. Dezinfecția terminală se efectuează prin:

- a. pulverizare
- b. pulverizaresauvaporizare**
- c. soluții septică
- d. soluții dezinfectante indiferent de concentrația acestora

9. Personalul care efectuează acuratenția și dezinfecția este obligat să:

- a. poartă manusi de unică folosintă, sterile**
- b. se spele și să se dezinfecțeze după scoaterea manusiilor
- c. poartă manusi de unică folosință nesterile
- d. prepare soluții dezinfectante în concentrația recomandată de producător

10. În cazul fracturilor coloanei vertebrale:

- a. pacientul este ajutat să se seze într-o poziție cat mai comodă, care să îi reducă durerea
- b. se imobilizează parțial zona
- c. pacientul este culcat pe spate, pe un plan dur**
- d. pacientul va fi culcat pe spate, cu capul sus orridicat, aplicând o punga de gheata

11. Cele mai cunoscute regimuri alimentare utilizate în unitatile sanitare sunt:

- a. hidric, hidro-zaharat, lichid, lactat, lacto-fainos, vegetarian, hepatic, renal, cardio-vascular, diabetic
- b. hepatic, renal, cardio-vascular, diabetic, hidric, lacto-fainos, uro-genital, hidro-zaharat
- c. renal, hepatic, diabetic, hidric, lacto-fainos, hidro-zaharat, cardio-vascular
- d. hidric, hidro-zaharat, semilichid, lacto-fainos vegetarian, hepatic, renal, cardio-vascular, diabetic, hipocaloric, lactat**

12. Care masura este corecta privind depozitarea temporara a lenjeriei murdare?

**a. se face pentru maximum 24 ore**

b. se face pentru maximum 6 ore

c. se face pentru maximum 1 ora

d. se face pentru maximum 30 minute

13. Ambalarea lenjeriei murdare, conform circuitului standard, se face astfel:

a. in ambalaj simplu

**b. prin ambalare dubla pe un lenjerie contaminata**

c. prin ambalare in sac textile reutilizabil

d. prin ambalare in pungi de plastic transparente

14. Dezinfectia terminala presupune:

**a. curatarea si dezinfecarea aparaturii de anestezie prin demontare**

**b. se face saptamanal, in ziua de repaus a salilor de operatii**

**c. curatarea vanului si a peretilor cu o laveta imbibata in detergent-dezinfector**

d. nu se curata si dezinfecțeaza usile si geamurile

15. Sursa de agenti patogeni a unui izvor infectios este reprezentata de:

a. omul bolnav, animale, pasari bolnave, microorganisme, factori climatici si sociali

**b. omul bolnav, convalescent, purtatorul sanatos de germe**

c. animale si pasari ca izvor de infectie care sa fie bolnave, fie purtatoare de diferiti agenti patogeni, microorganisme, macroorganisme si mediu extern.

d. omul bolnav, microorganisme, agenti patogeni.

16. Pozitia procliva este:

a. cu capul coborat se obtine prin ridicarea extremitatii distale ale patului

**b. cu capul mai sus se obtine prin ridicarea extremitatii proximale ale patului**

c. cu capul coborat prin ridicarea extremitatii proximale ale patului

d. pacientul sa fie asezat intr-o pozitie confortabila in raport cu starea sa generala

17. Produsele biocide tip 1 și 2 utilizate în unitățile sanitare, în funcție de scopul utilizării, trebuie să prezinte efect :

**a. bactericid;**

**b. fungicid;**

**c. micobactericid;**

**d. virulicid și sporicid.**

18. Deseurile nepericuloase se clasifica in :

**a. deseuri menajere ;**

**b. deseuri asimilabile cu cele menajere;**

**c. deseuri reciclabile;**

d. deseuri farmaceutice.

19. Curățarea se realizează cu:

**a. detergenți,**

**b. produse de întreținere**

c. dezinfecțanti

**d. produse de curățat**

20. Suprafetele, instrumentarul si echipamentele sunt clasificate dupa cum urmeaza:

- a. critice, mai putin critice;
- b. noncritice, sever critice si slab critice;
- c. critice, semicritice si noncritice;**
- d. cu potential critic si noncritic.

**Barem notare pentru fiecare intrebare grila este .....2 pct.**

## **SUBIECTUL II**

**Definiti Decontaminarea conform Ordinului 1.761 /03.07.2021** si precizati cum se realizeaza **curatarea** conform ord.1761 art 4.....**20 pct**

Procesul de neutralizare/indepartare a unor substante periculoase sau radioactive,inclusiv a incarcaturii microbiene de pe un obiect,o suprafata sau persoana ,etapa importanta in dezinfectie si o sterilizare.....**5 pct..**

-curatarea se realizeaza cu detergenti,produse de intretinere si curatare,utilizandu-se echipamente profesionale de curatenie.

-mopurile plate si lavetele lavabile (pe coduri de culori. trebuie sa reziste spalarii si termodezinfectiei).

-mopurile plate si lavetele pot fi de unica utilizare sau reutilizabile(care sa suporte urmatoarele etape ;curatare,dezinfectie ,uscare,impregnare cu solutia de detergent/dezinfectant inainte de utilizare..Sr interzice utilizarea mopolui cu franjuri,cu exceptia celor care pot fi supuse termodezinfectiei.

-se foloseste un mop plat la o suprafata de max.20m,cu schimbarea oblogatorie a acestuia la trecerea dintr-o incaperere in alta.

-lavetele pentru suprafata vor fi individualizate(respectand codul de culori stabilit),sau de unica folosinta /suprafata.

-mopurile si lavetele folosite se curata si dezinfecțează în mașinile de spălat din spălătoria spitalului sau din incaperile/spațiile special amenajate.

-pentru asigurarea unui rulaj optim de rezervede mopi si lavete este necesar un nr de minimum 3 ori mai mare fata de necesarul calculat.....**5 pct**

## **SUBIECTUL III**

**Precizati afectiunile/leziunile care impun transportul cu targa in urmatoarele pozitii : in decubit dorsal ;pozitie sezanda ;pozitie semisezanda; pozitie decubit ventral**.....**20 pct**

**In decubit dorsal:**.....**5 pct**

- pacientii cu traumatisme abdominale cu genunchi flectati
- accidentatii constienti,suspectii de fractura a coloanei vertebrale sau a bazei craniului:se asigura suprafata rigida;
- leziuni ale membrelor inferioare,sub membru lezat se aseaza o perna;
- leziuni ale membrelor superioare:membrul superioar lezat se aseaza peste toracele pacientului ,eventual se fixeaza cu o esarfă
- accidentatii in stare de soc cu hemoragie:cu membrele inferioare ridicate

**In pozitie sezanda:**.....**5 pct**

- pacientii cu traumatisme craniene,constienti si fara semne de soc:mentinuti cu ajutorul pernelor
- leziuni ale gâtului: capul va fi flectat,astfel incat regiunea mentoniera sa atinga toracele

**In pozitie semisezanda:**.....**5 pct**

- accidentatii toraco-pulmonare
- pacientii cu insuficienta cardiospiratorie
- accidentatii cu leziunile toraco-abdominale ( pozitia Fowler. cu genunchii flectati

**In pozitie decubit ventral:**.....**5 pct**

- pacienti cu leziuni ale fetei( craniofaciale.; sub fruntea lor se aseaza un sul improvizat din cearceafuri sau antebratul flectat al traumatizatului
- cu leziuni ale spatelui sau regiunii fesiere

#### SUBIECTUL IV

Precizati si descrieti prevenirea escarelor:.....20pct

Prevenirea escarelor „unde nu exista presiune acolo nu vor exista escare”

Escarele de decubit pot fi prevenite printr-o supraveghere constiincioasa a persoanei asistate imobilizate la pat

- Patul trebuie facut foarte atent cu cearceaful musamaua si aleza bine intinse,lenjeria de corp bine aranjata, fara cute.In continuare se va controla sa nu ramana obiecte straine cat de mici in patul asistatului, iar aparatele gipsate vor fi verificate zilnic. Suprafetele predispuze la escare vor fi asezate pe colaci de cauciuc,pe inele sau pe perne estice. Musamua ,colacii,pernele elastice precum si celealte obiecte de cauciuc utilizate la ingrijire,vor fi imbrilate,evitand contactul lor direct cu pielea pacientului.....5pct

- Pentru captarea scaunului si a urinei la pacientii imobilizati la pat, este bine a se utilize bazinete pneumatice. Asezarea si scoaterea bazinetului (plostii . de sub pacient trebuie facuta cu blindete,intruat miscarile brustice sau dezlipirea brutală a bazinetului de pe pielea afectata poate sa contribuie la dezepitelizarea suprafetelor cutante.Pacientul trebuie in patul numai timpul strict necesar,intarzirea scoaterii plostii de sub el nu este permisa,mai bine se va reaseza dupa un interval de timp in care circulatia pe suprafetele cutanate interesante se restabileste.....5pct

-La intervale de timp,se va schimba pozitia pacientului in pat,asezandul pe rand in decubit dorsal,decubit lateral stang,decubit ventral,decubit lateral drept.....2pct

-Tegumentele pacientului imobilizat la pat trebuie intretinute uscate si curate, Dupa fiecare mictiune sau defecare va fi spalat,uscat si pudrat cu talc.Pentru evitarea aparitiei leziunilor la nivelul pielii,lenjeria uita se va schimba frecvent,suprafetele cutanate vor fi aerisite zilnic de mai multe ori si pudrate din nou cu talc. ....4pct

-Suprafetele expuse escarelor vor fi spalate zilnic cu apa si sapun cu foarte mare blandete si apoi frictionate pentru activarea circulatiei locale.....2pct

-Prevenirea escarelor consta prin urmare in eliberarea de sub presiune a proeminentelor osoase in asociere cu corecta pozitionare a pacientului.....2pct